

7
TENTAMEN MEDICUM,
INAUGURALE,
DE

VARIOLA.

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

JOANNES FERRIAR,

BRITANNUS,

Soc. Reg. Med. Edin. Soc.

Ad diem 25. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXI.

Dr. Duncan

from his much obd. able servt.

the author.

TENTAMEN MEDICUM,

INAUGURALE,

DE

VARIOLA.

P R Æ F A T I O.

STATUENTI in campo medico cursum peragere primum, res tantae, tamque diversa occurrunt facie, ut semper in dubio inter eligendum aliquandiu haereat; et sane a variis scriptoribus tam diverse tractantur quam deliguntur themata. Alii scilicet tramite consueto inambulant, felices sese habentes, etsi famae ignoti, si criticorum objurgationes, irridentium futilia evadant;

evadant ; laudis spe parum, opprobrii timore plus aequo affecti. Attamen alii mente praediti altiore, nihili aestumant incolumitatem, quam non comitatur plausus bonas literas persequentium ; malevolentiam istam spernentes, ab hominibus animi effraenati manifestatam, dum ingenii perscrutant primitias. Tales res novas detegere gaudent, dogmata vetera vel stabilire, aut verecundia debita rejicere, sententias hodiernas liberè perpendere, intra modum vim imaginatricem cohibentes, dum falsa arguant, aut sophistica irrideant. Hos passibus haud aequis sequi vellem, imperitiae conscius etsi meae ; quum enim detegenda est veritas, quisquis latebras accedat, ei, quanquam conatus irritus fit, plus laudis quam debetur dedecoris. Quum igitur, more almae hujus academiae, rem aliquam medicam exponere meum est, de variola nunc breviter dicturus sum.

Si nunc diei egeret definitione verbum Variola, ea certe uterer cl. Culleni,
G.

G. XXVIII. systematis proprii nosologici propofita, omnibus admodum probata, omnibus igitur qui huc mentem nuper adverterint ufurpata. Si cuique igitur, variolae notitia lateat, illuc tendere moneo. Observandum est solummodo, de variola naturali, i. e. arte non inducta, in paginis fequentibus verba effe faciunda.

H I S T O R I A M O R B I.

Incipit morbus, aliquot dies post contagium exceptum, in adultis, rigore, deinde calore, capitis atque tergi dolore, vehementi in sudorem proclivitate, comate, vomitu, epigastrii etiamque compressi dolore. Haec per biduum faeviunt; inde paroxyfmi faepius adveniunt epileptici infantibus, quos interdum gravius, interdum mitius afficiunt. Finem tertii diei versus, papulae, levis ruboris, acicularum capitum instar, sese ostendunt. Initio, hae superiorem corporis

ris

ris partem solam, sed, progrediente morbo, artus quoque invadunt; atque, diem circiter quintum, peracta eruptione, febris recedit. Lenissima tamen in variola, prima eruptione omnino decedit febris. Papularum areolae, antea pallidae, nunc rubescunt, ipsaque papula plenior, fluidoque oppleta, evadit. Sic ad octavum res se habent usque diem. Dehinc progreditur suppurationis pustularum, quae ad diem undecimum sponte rumpuntur, atque mox crustosae apparent; ac intra tres quatuorve dies decidunt.

Haec variolae species benignior, quae Discreta audit. In confluente, omnia accessus symptomata graviora sunt, atque distinguitur a specie priore, tum cohaesione pustularum insigni, tum febris pertinacia, quae aut nequaquam cedit eruptioni, aut remissionem tantum patitur. Dicit etiam Sydenhamus, pustulas interdum non ante diem quartum erumpere, nempe ob aggressum doloris cujusdam vehementis, vel vomitus.

mitus. Pustulae confluentes ad diem octavum laminae albae exhibent speciem, tumoremque vultus insignem efficiunt. In adultis ptyalismus, in infantibus diarrhoea, insuper additur. Notavit Sydenhamus, pustulas extremorum, quae multo serius suppurantur, illis faciei et corporis largiores esse; atque plurimis in exemplis distinctae eminent. Circiter diem undecimum, pustulae disrumpuntur et corrugant. Saepius antehac oritur febris secundaria, quae plurimis lethalis evadit, atque, secundum Hoffmannum, die nono vel undecimo necat. Hoc tempore cedit ptyalismus vel diarrhoea, et cursu debito morbi, manus tument. Tunc color pustularum, adhuc albidus, in pullum transit, brevique fit desquamatio, quae diem circiter quindecimum terminatur. Post confluentes, foveolae plerumque manent; interdum cicatrices latae, foediffimae.

Fluidorum summam putredinem saepius variolam comitari, monstrant petechiae cum
pustulis

pustulis commixtae ; monstrant haemorrhagiae a Sydenhamo descriptae ; denique demortuorum ex variola sectio, quibus sanguis nullibi coagulatus reperitur*.

Huic adjungatur celeb. Hoffmanni observatio, in verbis propriis : ‘ Accidit haud
 ‘ raro, ut, exsiccatas jam quae effloruerant
 ‘ pustulis, ultimis diebus, novae et minores
 ‘ res compareant aliae. Si recedant, fieri
 ‘ possunt praeter spem funestae.’ Conclusio hujus morbi fatalis fit convulsionibus, interdum comate.

Quaestio fuit, an unquam viscerum abdominalium epidermidi porrigatur eruptio. Hoc semel me vidisse credo, in pueri (ex variola, ut visum, defuncti) intestinis ; quae, per totam superficiem internam, pustulis aperte maturis scatuere. Attamen, in facie, pustulae jam ad desquamationem promptae exstiterent. Nihil de hujus morbi historia mihi notum, quum, hyeme proxime

* Hoffman. de feb. variol.

me elapsa, inter cadavera ad secandum promiscue collecta, allatum fuit, in usum discipulorum ill. Doctoris Hunter.

Variola interdum praebet valetudinem antea debilibus, et, e contrario, antea sani, hac peracta, in varios illabuntur morbos, uti typhum, tabem, vel amaurosin; qui omnes torporem indicant. Hac de re audi Hoffmannum: ‘Quibusdam, post exsiccationem, febris manet lenta, et in extremis, praesertim articulis, tumores oriuntur, et ex his fiunt foeda, exedenda, et ossibus cariem inducentia, ulcera, difficilime sanatu, et postremo mortem inferentia.’

D I A G N O S I S.

Ex symptomatibus jam descriptis, facile fieri potest diagnosi variolae. Initio, a ru-beola distinguitur, absentia coryzae, oculorumque affectuum; et a plerisque aliis ex-

anthematibus, tardiore eruptione, atque forma papularum. Observavit Cl. Sydenhamus, variolam confluentem interdum ad eruptionem speciem exhibere erysipelatis; ab hac autem facile ex historia dignosci; dolore sc. epigastrii, atque defectu delirii; tum quoque tempore eruptionis. Dolore recensito, atque comate, nec non paroxysmis epilepticis, juncta praesertim epidemiae notitia, a febris propriis certo distinguitur variola.

C A U S A E.

De causis non omnino disputandum; quippe quae, a viro speciali ad corpus admoto, uti inter omnes convenit, pendent. Hujus natura latet; vis autem est notissima.

P R O-

P R O G N O S I S.

Haecce febris statum, indeque eruptionis faciem, respicit; scilicet, quantum mitiora sint symptomata morbi advenientis, (quibus parca, vel nulla epilepsia annumeranda), quantum ferius apparent papulae, et quo magis discretae, tantum minus, contrariis autem locum habentibus, plus periculi. Si, progrediente morbo, ante diem undecimum confluentis, defit ptyalismus, certissime peribit aegrotus; itidemque, si tunc temporis non succedat tumefactio extremorum.

Discretae etiam tumor aliquis faciei necessarius videtur; et si ad diem octavum vultus lentus appareat, et pustularum interstitia pallida evadant, (quod saepius praegresso multo sudore accidit), mortem adflare suspicetur medicus.

R A T I O S Y M P T O M A T U M.

Eruptionis modus vi febris primariae respondet: Minus enim credibile videtur, aut contagii naturam, aut molem fluidorum, in aegrotis variis affimilatam, inter sese differre. A spafino vasorum extremorum aegre subacto pendet, me iudice, eruptio; quum, spafino deficiente, neque propria forma existare poterit febris, nec phlegmonae, quales revera sunt papulae variolosae. Spafini igitur pertinaciae, vel cordis atque arteriarum impetui, omnes variolae differentias tribuere vellem. Nam, ex priore, febris durationem saepius pendere, ab ill. Culleni sectionibus quibusdam facile patebit*. Principiis illic stabilitis confidens, caloris externi actionem nocere cenfeo, diathesin creando phlogisticam. Hinc regiminis vetusti errores: Hinc Stygia impleta ora. Ab cordis enim et arteriarum actione

immodica,

* First Lines, par. LXII. LXIII.

immodica, innumera oriuntur mala, five calore externo augetur, five spafmo forti sustentatur. Delirium adfert; eruptionem dat eryfipelatofam; haemorrhagias e variis partibus elicit; et fluidorum putredinem movet, fignis praedictis nimis facile notandam. At, frigoris debito admoto gradu, atque adhibita methodo antiphlogiftica, in variola praefertim quae infita fuit, adeo moderatur febris primaria, ut faepius vix aliquid afferat molefti; ibi quoque pauciffimae erumpunt papulae. E contra, febris quae confluentem praecedit, faeviffima eft, morbumque periculofum adefle teftatur. Huc, attamen, aliquid confert habitus aegroti, faltem quoad vim augendam vaforum, vel ad putredinem promovendam.

Inter febrem primariam, ut et per morbum totum, ex modo fanos inficiendi, multum exhalari compertum habemus. * Quidam enim infitionem instituit ope humoris

ris

* Baker's Inquiry into a new method of inoculation, p. 9.

ris brachio adempti, ante eruptionem factam, etiamque intra diem ab insitione quartum.

-In variola confluenti, ubi pustulae, per majorem corporis partem quasi operculum efficiunt cutis, extremorum tumores e materia perspirabili retenta constare videntur; quoniam, si subito decrescant, (resorpta dicam materia), actum est de aegroto.

METHODUS MEDENDI.

In medendo, nulla est opus indicatione; quia morbus cursum peragit legitimum, medico non obstante. Licet autem virus extinguere, eoque modo morbum prorsus tollere, ignoremus; justo tamen regimine, medicamentisque rite adhibitis, symptomata multa submoveri, et omnia levari possunt.

Initio morbi, febris primariae aggredientis vehementiam praecavere, accessam temperare,

perare, est medici; alia, atque minora, sub nullis signis instruenda sunt. Febris igitur adveniens frigoris plena adhibitione minuenda est: Huic diluentia vel refrigerantia jungere oportet; atque emetici necessitatem certe indicant, affectiones ventriculi.

Saepe etiam in usu est pediluvium ad pueros; de quo, attamen, multum dubitant medici, regiminis reliquae rationi adversum esse putantes. Hoc in tyrocinio studiorum saepius adhibitum vidi, saepe ipse praecepi, semper sine molestia, interdum, ut visum, cum fructu.

Sin autem vel haec spem fefellerint, vel si medicus non accersitus fuerit donec saevire inceperat febris, et jam minitari, praefertim si in dubio ponatur an variola sit, an alius morbus, certissime sanguinis missione uti convenit. Etsi tamen venaesectio non solum non eruptionem impediat, sed etiam promoveat, motus vasorum enor-

mes compescendo, haud impune feretur repetitio ; atque cito invasura debilitas, in confluyente saltem, ubi maxime saevit febris primaria, medicum a largis evacuationibus absterreat. Observavit enim Cl. Sydenhamus, pessimam variolam ortam fuisse in puella, quae rheumatismum acutum propediem antea superaverat ope evacuantium.

Alvus diligenter movenda est catharticis, clysteribus saltem quotidie adhibitis. Æger vel sub pleno Jove, vel cubiculo amplo, amoenno, maneat ; noctu stragulis paucioribus quam consuetis utatur. Sit diaeta tenuis, potus subfrigidus, lenis, vel cum portione acidi cujusquam commixtus.

Mature adveniens epilepsia, multum saevire solet, atque, mortem ipsam minitans, notationem deposcit assiduam. Huic venaesectione, sed praesertim anodynis libere adhibitis, occurrendum.

Peraeta

Peracta eruptione, si febris vel ex aliqua parte vel ex toto cesserit, si papulae sint raras atque discretas, et nulla molestia urgeat, frigori, atque naturae virium tutelae, prorsus committatur aegrotus. Sin autem alvus sit nimis adstricta, semper solvere est opus.

Variola tamen confluens, jam descripta, multum intentionis simulac judicii exigit; morbus horrendus, quippe vel vitam vel pulchritudinem nimis certo deleturus. Quod ad hanc speciem, in adultis, ad febrem continuatam, vel certe minime levatam, ad cutis dolorem ac inflammationem, ad fluidorum putredinem, et febrem secundariam, spectare oportet. Febris, ut in aliis febribus, venaesectione, si opus sit, et antimonii praeparationibus, quae saepius et emetica et cathartica fiunt, tractetur. Hanc methodum non est cur fusius explicarem, quum ad inceptum meum haud attinere videtur.

Cutis dolor, perpetuo torquens, atque miserum ab omni requie impediens, febris secundariae denuo ortum maxime praebens, anodynis optime levatur. Primus ill. Sydenhamus opii usum instituit, atque maxime laudavit; cujus sententiam sequentes medici confirmarunt. Finita igitur eruptione, adhibeatur opium, bis singulis diebus, usque ad morbi metam. Mirum equidem videtur, papularum puncturam, atque hanc iteratam, medicos non saepius instituisse; magnam enim abripit irritationem, et multum confert ad febrem secundariam praeveniendam.

Fluidorum putredo, sedula ventilatione, enixa munditia, alvoque nunquam non soluta, praevenerit. Plena tamen curatio putredinis jam accessae, a tonicis, stimulis, atque antiseptis petenda; a cortice Peruviano, scilicet, vino, atque acidis.

Modus febrem secundariam tractandi, a natura ipsius diatheseos phlogisticae, vel
putredinis

putredinis praevalentis, ducatur oportet. Hujusce accessio optime mitigatur cutis dolorem molliendo, atque debiti regiminis assidua adhibitione.

Si finem versus sputationis, saliva, jam crassa et difficilis screatu, deglutitionem impediat, vel strangulationem minetur, gargarismus proponatur. Dixit Sydenhamus, emeticum, rebus ita sese habentibus, multum prodesse.

Quum retrocedit eruptio, vel subito detument extrema, admoveantur plantis pedum vel sinapismi, vel vesicantia.

Quoad cathartorum usum, decesso morbo, nil certum accepimus: Multae morbi sequelae signa debilitatis atque torporis edunt; haud igitur purgatione depellendae. Haecce praxis theoria sola, ut visum, innititur; namque cathartica obveniundo abscessus solum profunt, et hoc quidem levissime efficiunt. Denique, morbi sequelas
pro

pro natura singularum tractare, ac si nulum praecefferit malum, sed cavere evacuationem, debet.

Etsi operis summum pertigisse videar, restat autem quaerere, cur neminem nisi semel variola invadat. Haec res, ut mihi videtur, est et magni momenti, et adhuc parum explorata. Mihi, hoc opus aggredienti, temeritatem vel ineptiam verisimile obferent plerique: Theoriam hancce ante eorum pedes projicio; et hoc solum rogo, ne quisquam me judicet antequam perlegat. Praemittendum attamen, variolam bis in uno homine obortam fuisse, uti quidam testantur autores*; phaenomenon igitur non pro lege immutabili, sed pro conditione generali, habeatur.

Vitae processus, nervorum statu, magis quam partium incremento, distinguitur.

Quod

* Home's Medical Facts and Experiments, p. 94.
Hensler de morb. variol. tent. de variol. secund.

Quod ad molem, quidem, infans et adultus inter sese differunt; multo magis autem quod ad nervorum systemata. Hinc, ingesta in ventriculum acida facta, quae a-
dulto anxietatem et ructum tantum inferrent, infantem convulsione epileptica afficerent. Hinc, a dentitione tanta ducuntur mala, dum odontalgia, quamvis gravissima, vitam nunquam minatur. In pueris, abdominis viscera mire irritabilia sunt, ut in vomendi (in adultis plurimis gravissimi) actione, facile citata atque peracta; ut et in diarrhoeis, saepe et sine ulla fere molestia iteratis, admota levi causa, atque excretionem frequenti stercoreis et lotii, pene absque conamine, cernere est. Et sane tanta mobilitas ad pueri incolumitatem necessaria videtur. Ope enim perpetuo egens aliena, vel ad noxia abigenda, aut necessaria paranda, oportuit ad omnem tactum animum attentum advertere, ut ex querelis, risibusve,
eum

eum dolere aut gaudere adverterent custodes.

Cutis, hoc temporis, mollis, delicata, sensu praedita exquisito, adeo ut, si in hoc statu per totam vitam permanferit, genus humanum doloribus torqueret gravissimis. Quam miser fuerit iste, ab accuratissimo Gooch memoratus, cui prurigo vix ferenda inducta fuit per totam corporis superficiem, a solis radiis, omnibus praeterea bonum afferentibus.

Infantum epilepsia, antequam morbos pueriles dictos subierint, tam dira atque frequens, his superatis, fere semper decedit, et ex omni functione irritabilitatis decrementum patet. Inter omnes quidem convenit, certa aetate mobilitatem subito atque maxime imminui, nunquam tamen nisi praegressis morbis accidat. His igitur aliquantum tribui oportet, quum nexu loci atque temporis solum deprehendimus causam atque effectum. Nec hi effectus
morbidum

morbidi habendi; corpus enim vitae officiis aptius redditur.

In variola torporem valere, docent ejus sequelae, in historia jam enumeratae; atque talem causam, reliquis junctam postea dicendis, subito mobilitatem imminuere, pauci negabunt. Ejus enim effectus, aliter haud permanens, operatione sequente aliorum conservatur.

Impressionibus extrinsecus semper fumus obnoxii, quae, si numero immodicae, mentem opprimunt; si paucitate errant, animam, quasi somnolentam, vix emovere possunt. Harum plurimae inveniuntur sedantes, Liberi praesertim ritus, hique conubii aut Veneris abnormis, quorum unum vel alterum fere omnes summo persequuntur nisu. Cibo utimur stimulanti, processus inde concoquens somni cupidinem infert; vis sedantis planum documentum. Cogitatio multa, sive de philosophia vel negotio, maxime sedare reperitur, atque nugae

gaë splendidæ, quæ a cogitando animi omnino revocant, plus ipsa speculatione mentem laceffunt. Sic, five contemplatur aliquis, five mercatur, five vitæ delicias solum persequitur, omnia mentem, indeque corpus, seu vice versa, deprimere certant. Nequaquam affirmo, omne impressum statim sedare, omne vehemens tamen hoc citius feriusve facere facile credo, quum motus validos vel animi vel corporis ciet.

Inflammatiô quidem omnis, a contagio specifico præsertim, partis mobilitatem maxime imminuit. Ita, qui gonorrhoea gravi laboravere, etiam post fluxus, omniumque symptomatum decessum, urethraë fistulam, atque balanum, sensu consueto multum privari percipiunt. Sin hoc efficeret canalis unice affectio digitos paucos extensa, quid faceret totæ cutis inflammatio, a systematis statu morbido orta?

Hanc etiam legem pertulit natura generi humano, quod impressiones validæ debili-

monstrantes. Et sane color cutis, post pustularum decessionem, mutationem notat insignem *. Denique, quum haecce foveolae, durante vita, maneant, mutationem subitam permanere, fas est ut deducam. Sed, utrum super vasa extrema cicatriculae inducuntur, an mobilitate quoad stimulum specificum privantur, non meum equidem est judicare: Mihi sufficiet perceptio facti. Cutis jam mutata nequit amplius eadem affici causa, cui obstat, etsi nullis foveolis foedata.

Alii morbi quidem, qui pro tempore tantum aliquid corporis mutant, saepe atque in assuefactis facile renovantur; quosdam tamen esse morbos oportet, a quibus mutatio inducta permanens, quamvis non lethalis sit. Haec autem permutatio fluidis accidere nequit, quum ipsa subinde mutantur; solidis solis induci potest.

Non tam universa autem est cutis affectio, quin aliquibus locis viri novae adhibitioni

* Cullen's First Lines, vol. ii. p. 38.

fioni cedat. Nutrices enim, matresve, quae prima juventute variola correptae fuere, dum alumnum variolosum pertractant, brachiisque gerunt, super partes infanti applicatas, pustulas, variolosis similes, exfurgere vident. Huic autem quasi infitioni, aliae causae jam memoratae valde resistunt, et plerumque morbum depellunt.

Ubi autem systema torpidum dixi, non ita ut morbide intelligatur, at solum ita imminui mobilitatem extremam, ut vegetiora deveniant solida. Et, quamvis unica quaevis phaenomeni causarum, jam adscriptarum, omnino impar videbitur ad explanationem, junctio omnium haud tam inefficax, puto, invenietur.

Nam generis nervosi sensus hebetior, senectutem saepius praeoccupans, atque tota vitae hodiernae consuetudine adjuvatus; huic annuens morbi sequela, torpor, integratio cujusvis impressionis lenior, cutis de-

mum

mum vaforum permutatio, huc colligenda sunt.

Senes, interdum, hoc morbo in juventute devitato, denique contagium excipiunt, et in variolam incidunt; atque hoc nostram theoriam refellere creditur. Hi tamen praedispositi sunt, quatenus nunquam variolam subierunt; contra cujus aggressum nullam tutelam praebet senectus, praeter torporem, qui solus nequaquam morbum depellere valet. Atque si contagium, juveni adhibitum, non intulerit morbum, haud mirum. Nam, in ordine rerum, facile intelligimus, quod causa praedisponens, atque occasionalis, nunquam simul applicatae fuere. Notum est, praeterea, quod in infantibus quibusdam, perpaucis tamen, non apparebit morbus, post secundam etiam infectionem; praeterito autem brevi tempore, si iterum fiat infectio, febricitat infans.

Qui variolam bis acceperint paucissimi sunt; de quibus nihil satis plenum cognovi, ut phaenomeni explicationem aggrederer.

Constat

Constat autem hos omnes juvenes fuisse, adhuc igitur, quamvis minus quam antea, mobiles; atque exceptiones ab instituto generali, hic quoque, ut in plurimis aliis naturae phaenomenis, patent. Neque has exceptiones, magis quam hominem natum sine cerebro, corde, vel ore, mirari oportet.

Denique, si casibus plurimis, et communi ordini morbi, conveniat haec doctrina, ad singula, ab idiosyncrasia, vel rerum fortuitate, nata, parum spectandum.

Sententias peritiorum, in plurimis theoriae hujusce locis, me non secutum fuisse, et verum et mihi rectum constat. Ea enim dissensio vix vitanda est, si unquam ratio cinemur, si libere, non omnino. De his quidem multa dicere vellem; at quae publico nondum tradidisset autor, neminis est scriptis contradicere. Nimis facile enim potest aliquis, absque fraudis consilio, alterius mentem, semel elocutam, permutare, verbo vel singulari variando. Quidquid
autem

autem in publicum ediderit autor, libere decet omnes tractare; ipsa enim verba cuique patent.

Quae, brevi jam sermone, proposui, mihi pro veris habita, non ex omni parte certa esse, haud inficias eo; nam hicce nodus, sat scio, difficillimus est solutu. Aliqua tamen me movisse, huc nondum applicata, quanquam alias notissima, putarem; quae nec repente, nec audacter, sed post multam cogitationem, sollicitus hic profero. Ast huc me tulit animus, de theseos themate dubitantem, etsi pericula innovandi noscentem, rei que ipsius incertitudinem. Mansuetudini igitur vestrae, magis quam propriis viribus confisus, Praeceptores optimi, haec obferre statui, atque pleno die illustrati aevi veritatem per avia assequi conatus. Si hanc nondum tetigisse videar, plorare est meum, haud tamen spero aliorum erit culpae. Omnibus ratiociniis peractis, demum fortasse confedere, et sententiae dare manus Socraticae oportet; quod nihil compertum habemus, nisi quod nihil scimus.

F I N I S.

